

GELİK CİVARINDAKİ SULU VE ŞÜPHELİ SULU DAMARLARININ PALİNOLOJİK KORELÂSYONU

Erol AKYOL

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara

ÖZET»— Tez çalışmalarımızın bir kısmı, Vestfalien A yaşı, Sulu, şüpheli Sulu, Hacı Memiş ve Milopero olmak üzere beş damarın palinolojik etüdleri ile ilgili idi. Burada biz., Sulu ve şüpheli Sulu damarlarının mikroflorasının kompozisyon ve karakterlerini yaynlamak ve aynı zamanda bu iki damarın sporo-pollinik korelasyon tablosunu açıklamak istiyoruz.

A, NUMUNELERİN ETÜDÜ

1. NUMUNELERİN ALINIŞI


Numuneler Zonguldak baseninin Gelik bölgесine aittirler* Sulu damarını 19 seviyeye ayıran 19 adet numune, 4 ve 8 no* li faylar arasında bulunan ⁴67 galerisinden alınmıştır* Diğer taraftan, şüpheli Sulu damarının 13 seviyesine ait 13 adet numune, 4y 7 ve 8 no* li faylar arasındaki ^{*}30 galerisinden toplanmıştır* İki galeri arasında takriben L5 km mesafe bulunmaktadır (Tablo I ve II).

Numunelerin alındığı noktada, geniş bir Vestfalien aflörmanı, güneyde Namuriene ait sahalarla çevrelenmiştir. B~W eksenli bir senkinal meydana getirmektedir* Kretase yaşı, daha genç formasyonlar güneyde Natnurien üzerine veya Karadon serisi (Vestfalien B,C,D) üzerine diskordan olarak gelmektedirler*


Bu bölgenin Vestfalien A serisi* Zonguldak baseni Vestfalien A sınıfının ilk defa etüd edilmiş olduğu Kozlu*daki Vestfalien A tip serisine uymaktadır* Bu sebeple, bu bölgenin Vestfalien A sınıfının «Kozlu serisi» ismi altında anılmakta olup* tabandan Orta Vestfalien A sonuna kadar tespit edilmiş tip seri içinde şu damarlara rastlanmaktadır : .

Tablo - I

**İNCELENEN SEVİYELERİN
DETAYI**



Tablo - II
NUMUNELERİN ALINDIĞI YERLER



Küçük damarı	
Acılık damarı	Alt Vestfalien A
Sulu damarı	
Hacı Memiş damarı	
Neome damarı	
Milopero damarı	
Lükiça damarı	
Messoğlu damarı	
Aeenta damarı	
Taşbacı damarı	Orta Vestfalien A

Göründüğü gibi, etüd edilen iki damar Orta Vestfalien A nm tabanına yakındır.

2. NİTEL VE NICEL NETİCELER

Bu damarların palinolojik nitel ve nicel neticelerini elde etmek maksadıyla yapılan etüdlerde, gliserinli jelatin içine, etüdü yapılacak seviyeye ait maseresyon kalıntısından bir damla konmak suretiyle préparât hazırlanmış ve 1000 sporomorf sayılmış, ve aynı işlem her seviye için tekrar edilmiştir. Bazı seviyelerin etüdünde, 500 den fazla fert sayımına lüzum görürmemiştir; çünkü bu seviyelerde, *Lycosisporites* (Sch., WiL & Bent*) Levet-Carette, *Demi»sporites* (Berry) Levet-Carette ve *Cyclogranisporites* Pot* & Kr, dominant sporlar olduklarından, diğer aksesuar genusların pratik değerlerini azaltarak palinolojik korelâsyonlarda lüzumlu doneleri verebilmektedirler.

Nicel neticeler, yani spor ve pollenlerin tezahür yüzdeleri Tablo III te gösterilmiştir. Bu cetvelin apsisinde, sayılan 1000 sporomorf arasına giren genuslar numaralandırılmış ve ordinatta ise, Sulu ve şüpheli Sulu damarları seviyeleri ile birlikte işaretlenmiştir.

Apsisteki numaralar şu genislara karşılaşılmaktadır %

- 1, *Laevigatosporites* İbrahim
- 2, *Puncîatosporites* İbrahim
- 3, *Deltoidisporites* (Miner) Danzé-Corsin & Laveine
- A. *Punctatisporites* (İbr,) Pot, & Kr,
- 5, *Calamisporites* (Sch,, WiL & Bent,) Danzé-Cor. & Lav»
- 6, *Granulatisporites* İbrahim



- 7* *Cyclograni sporites* Pot* & Kr\\\
 8» *Verrucostsporites* İbrahim
 9* *Convolutisporites* (Hoff., Stap* & Mall)
 10. *Planisporites* (Knox) Pot* & Kr,
 11. *Apiculatisporites* (İbr*) Pot. & Kr*
 12* *Anapiculatisporites* Pot* & Kr»
 13* *Fustulatisporites* Pot* & Kr*
 14* *Acanthisporites* (Naumova) Dan,, Lev.-Car* & Lobož*
 15* *Microreticulatisporites* (Knox) Pot. & Kr.
 16* *Reticulatisporites* (İbr.) Pot. & Kr.
 17» *Knoxisporites* Pot* & Kr*
 18. *Lycosisporites* (Sch*, Wil* & Bent*) Levet-Carette
 19* *Densisporites* (Berry) Levet-Carette
 20* *Simozonisporites* (Naumova) Laveine
 21* *Sinusisporites* (Artüz)
 22* *Callisporites* Butt* & Wil*
 23* *Cirratrisporites* (Wilson & Coe) Laveine
 24* *Reinschisporites* (Seh., Wil. & Bent.) Laveine
 25* *Triquisporites* (Wilson & Coe) Dan*-Cor. & Lav
 26* *Ahrensisporites* Pot* & Kr*
 27* *Micropollenites* (Dijkstra) Laveine

Bu listede *Densisporites* (Berry) Levet-Carette genusu, *Densisporites* (Berry) Levet-Carette, *Anulatisporites* Loose, *Cristatisporites* Pot* & Kr* ve *Cingulizonatisporites* (Dyb. & Jach*) genuslarmı içine almak-tadır* Pratik olarak, son üç genus birinci ile kolaylıkla karıştırıla-bileceği gibi, yüzdelerinin, çok düşük olmaları itibariyle de *Densi-sporites* (Berry) Levet-Caretteln yüzdesine ilâve edilmelerinde bir mahzur yoktur*

3. NETİCELERİN YORUMU

Etüd mevzuu iki damar, Orta Vestfalieri A ya aittir* Yalnız Sulu ve şüpheli Sulu damarları arasında olmayıp, aynı zamanda Acılık, Hacı Memiş ve Milopero damarları arasında da mevcut olan palinolojik benzerlikler, bizi, palinolojik diyagramlardan çıkardığı-mız neticeleri, Alt ve Orta Vestfalien A ya teşmil etmeye zorla-maktadır; aynı zamanda, Y* Konyalımın (1963) elde ettiği netice-lere göre de, bütün Vestf alien A ya teşmil etmek yerinde olacaktır • Çünkü Y» Konyalımın Üst Vestfalien A ya ait bir damardan elde ettiği neticeler, bizim neticelerimize tamamen uymaktadır*

Tablo - III
SULU VE ŞÜPHELİ SULU DAMARLARININ PALİNOLOJİK KOMPOZİSYONU



% 40 dan fazla
% 20-40 arası
% 10-20 arası
% 5-10 arası
% 1-5 arası
% 1 den az

Damarların etiid diyagramlarına göre Vestfalien A ya maledilebilecek en önemli karakterler şöyle özetlenebilir:

- a« Palinolojik kompozisyonları incelendiği takdirde, bütün damaların birbirine benzedikleri görülmektedir.
- *Lycosisporites* (Sek, WiL & Bent-) Levet-Carette (*L. punetatus* Kosanke, *L. pusillus* (İbr-) Sch-, WiL & Bent*, *L. pseudoannulatus* Kosanke[^] *L* lepidus* Ar tuz)
- *Densisporites* (Berry) Levet-Carette (*D. duriti* Pot- & Kr., *D. lo** *batus* Kosanke, *D. capistratus* Hoff., Stap- & Mal-, *D. lori* Bhard-, *D. sphaerotriangularis* Kosanke., *D. mierosilvanus* Artüz) ve
- *Cyclogranisporites* Pot- & Kr- (bol miktarda *C. leopoldi* (Kr-) Pot- & Kr-, ve ender olarak *C. aureus* (Loose) Pot- & Kr-, *C. elatus* Artüz) genusları, palinolojik diyagramların en önemli hatlarını teşkil etmektedirler» Her seviye, bu üç genustan bir veya ikisi ve bazan da üçü tarafından karakterize edilmektedir-

Fakat her seviye için dominant genus, % 30-95 arasında tezahür etmesi sebebiyle, *Lycosisporites* (Sch-, Wil- & Bent-) Levet-Carette[^]tir- Seviyelerin çoğu, yüksek yüzdede *Lycosisporites* (Sch-, WiL & Bent-) Levet-Carette ihtiva etmekte ve bu yüzde % 50 nin altına düşünce yerini *Densisporites* (Berry) Levet-Carette'e bırakmaktadır. *Densisporites* (Berry) Levet-Carette, Vestfalien A nın en intizamsız genusudurj bazan hiç yok denecek kadar az (% 1 den az), bazan da seviyede bulunan sporomorflarm % 70 ini teşkil edecek kadar çoktur- *Cyclogranisporites* Pot- & Kr- genusu ise, her seviyede, hemen hemen düzgün bir şekilde % 1 ilâ 15 arasında bulunmaktadır.

Bu sebeplerden dolayı, bahis konusu üç genusun, her seviyenin sporomorflarının % 75-95 ini teşkil ettiklerini ve Vestfalien Anın temel genusu olduklarını düşünmekteyiz- Geri kalan % 5-25 sporomorflar aksesuar genuslara ait olup, bu genuslarm en önemlileri şunlardır:

Calamisporites (Sch-, Wil- & Bent.) Danze-Cor- & Lav- (*C. mutabilis* (Loose) Sch-, Wil- & Bent-, *C. hartungiana* Schöpf)

Planisporites (Knox) Pot- & Kr» (rastladığımız tek espes % *P. kotsankei* Pot- & Kr-)

Granulatisporites İbrahim (*G. parvus* (İbr-) Pot- & Kr- ve *G* munutus* Pot- & Kr,)

Apiculatisporites (İbr*) Pot* & Kr* (*A. aculeatus* İbrahim, *A. ahdistus* (Loose) Pot* & Kr*, *A. spinosus* Loose)

Reticulatisporites (İbr*) Pot» & Kr. (JR. *clatiformis* Artüz)

Deltoidisporites (Miner) Danzé-Cor* & Lav* (*D. convexus* Kosanke, *D. adnatoides* Pot* & Kr* *D. adnatus* (Kos*) Pot* & Kr*)

Adı geçen bu genuslar, hemen hemen her seviyede, gayet düşük yüzdelerle mevcuttur*

Düşük yüzdelerle bazı seviyelerde mevcut olan genuslar da şunlardır:

Punctatisporites (tbr*) Pot* & Kr* (*P. obesus* (Loose) Pot* & Kr*, *P. punctatus* İbrahim, *P. minutus* Kosanke); *Convolutisporites* Hoff*, Stap. & Mail*; *Microreticulatisporites* (Knox) Pot* & Kr.; *Dictyisporites* (Naumova) Levet-Carette (*D. bireticulatus* (İbr*) Pot* & Kr*) *Sinusisporites* (Artüz) (*S. sinuatus* Artüz); *Callisporites* Butt* & Wil* (*C. nux* Butt* & Wil); *Cirratrisporites* (Wilson & Coe) Laveine (*C. saturni* (Ibr*) Seh*, Wil* & Bent*); *Reinschisporites* (Seh*, Wil* & Bent*) Laveine (*R. spesiosus* (Loose) Seh*, Wil* & Bent*, *R. fimbriatus* Artüz); *Ährensisporites* Pot* & Kr. (*A. guerickei* (Horst) Pot* & Kr*, *A. angulatus* Kosanke, *A. marmaris* Akyol); *Florinipollenites* (Seh*, Wil* & Bent*) Laveine (*F. volans* (Loose) Pot* & Kr*); *Micropollenites* (Dijkstra) Laveine (*M. radiatus* İbrahim)*

Birkaç seviyede, nadiren şu genuslara rastlanmaktadır:

Laevigatosporites İbrahim, *Punctatosporites* İbrahim, *Verrucosisporites* İbrahim, *Anapiculatisporites* Pot* & Kr*, *Acanthisporites* (Naumova) Danzé, Levet-Carette & Loboziak, *Knoxisporites* Pot. & Kr*[^] *Simozonisporites* (Naumova) Laveine, *Triquisporites* (Wilson & Goe) Danzé-Cor*& Lav*

b. Monolet markalı sporlar sayıca çok azdır.

Etüdlerimiz esnasında bir tek *Punctatosporites* İbrahim'e (Sulu damarı, 2 no* li seviye) ve Sulu damarında çok az miktarda *Laevigatosporites* İbrahim'e rastlayabildik* Vestfalien C ve D nin karakteristiği olan *Torosporites* (Balme) Laveine genusuna ait, hiçbir spor göremedik*

- c. Alt ve Orta VestFalieı A da, sporların yanında pollenler yok denilebilecek kadar az miktarda tezahür etmektedirler.

Tayini yapılan *Florinipollenites* (Sdbu, WiL & Bent*) Laveine, *Micropollenites* (Dijkstra) Laveine, *Fragilipollenites* Konyalı, *Alipollenites* (Daug,) Danzé-Cor* & Laveine, *Alatipollenites* (İbi\.) Laveine ve *Endopollenites* (Wilson & Coe) Laveine genuslarmdan, yalnız *Florinipollenites* (Sdbu, WiL & Bent*) Laveine her beş damarda da mevcuttur*

- d. *Lycosporites* (Sefa., WiL & Bent.) Levet-Carette'in dominant genus olması ve *Cyclogranisporites* Pot. & Kr.'in de her seviyede hemen hemen aynı yüzdeye sahip olması sebebiyle, korelâsyon problemlerinin çözümünde, *Densisporites* (Berry) Levet-Carette genusünün yüzdesinin seviyeden seviyeye (veya damardan damara) ugradığı değişikliklerden faydalananmak gereklidir.

B. SULU VE ŞÜPHELİ SULU DAMARLARININ KORELÂSYONU

En tanınmış palinolojik korelâsyon metodlарmdan ikisi şunlardır:

1. Tüm profiline seviyelere bölünmesi metodu»
2. Ortalama numune metodu.

İkinci metod, zaman kazanma bakımından birinciye nazaran daha avantajlıdır ve bu sebeple daha çok kullanılmaktadır* Özel bir durum arzeden Sulu ve şüpheli Sulu damarlarının korelâsyon örneği, jeolojik ve işletmecilik problemlerinin daha sıhhatli bir şekilde halledilebilmesi yönünden, birinci metodun bazan avantajlı olabileceğini göstermektedir.

Ortalama numune metodu, Zonguldak baseni Vestfalien A damarlari korelâsyonlarında iyi neticeler verebilir; çünkü *Densisporites* (Berry) Levet-Carette'in yüzdeleri damardan damara hissedilir bir şekilde değişmektedir* Fakat, Sulu ve şüpheli Sulu damarlarında olduğu gibi, bir damarin bir kısmının, diğer bir damarin bir kısmına tekabül etmesi durumu mevcut olduğunda, damarların profilerini seviyelere bölerek, her seviyeye ait palinolojik kompozisyonu meydana çıkarmak elzemdir»

Temel genuslарm her seviyeye ait yüzdeleri toplanıp, damarın seviye sayısına bölünmesi sureti ile, o damarın ortalama numune

yüzdelerini % 5 hatta payı ile hesaplamış oluruz. Bu hesap neticesinde, bahis konusu iki damar için aşağıdaki neticeler elde edilmektedir.

	<i>Lycosisporites</i>	<i>Densisporites</i>	<i>Cyclogranisporites</i>
Sulu damarı	80	6	4
Şüpheli Sulu damarı..	59	28	4

Tablo - IV

SULU VE ŞÜPHELİ SULU DAMARLARININ SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI							
Sevi-yeler	Sulu damarı			Şüpheli Sulu damarı			Sevi-yeler
	<i>Lycosp.</i> (%)	<i>Densi-</i> sp. (%)	<i>Cyclogra-nisp.</i> (%)	<i>Lycosp.</i> (%)	<i>Densi-</i> sp. (%)	<i>Cyclogra-nisp.</i> (%)	
19				22	66	2.2	13
18				18	75	14	12
<i>Sporomorf ihtiva etmemektedirler</i>				37	50	2.2	11
				59	34	2	10
17	60	11	1.8	60	27	2	9
16							
15	86	1.3	3.1	89	1	2.2	8
14							
13	75	0.2	5.4	89	1	2.2	7
12							
11	70	0.1	21	71	10	7	6
10	79	2.3	6.6	74	4.3	7.4	4
9	15.4	66	1.1	24.6	58.3	1.6	3
8	80	4.6	3.7	77	12	2.8	2
7	91	0.5	1	82	1.4	2	1
6	92	2.5	0.4				
5	95	0.4	0.5				
4	94.5	0.6	1				
3	83	0.5	4.6				
2	88	0.5	5.7				
1	94	0.1	0.9				

Bu neticelere göre Sulu ve şüpheli Sulu damarları birbirlerinden çok farklıdır.* Bu damarların seviye seviye karşılaştırması sonucunda elde edilen netice, Tablo IV te gösterilmiştir.

Bu Tablodan da görülebileceği gibi, palinolojik neticelere göre birbirine intibak eden seviyeler şunlardır:

<i>Sulu daman</i>	<i>Şüpheli Sulu daman</i>
Seviye 7	Seviye 1
Seviye 8	"... Seviye 2
Seviye 9	Seviye 3
Seviye 10	Seviye 4
Seviye 11 + 12	Seviye 5 + 6
Seviye 13"	Seviye 7
Seviye 14 + 15 + 16	** Seviye 8
Seviye 17	Seviye 9

Bu duruma göre, damarların oluşum safhalarını şu şekilde irdeleyebiliriz :

— Sulu damarına ait lagün, şüpheli Sulu damarı lagününden daha evvel teşekkür etmiş ve böylece Sulu damarının 41 cm si çökelmiştir.

— Bundan sonra, şüpheli Sulu damarının bulunduğu mevkide bir lagün teşekkür ederek, aynı zamanda Sulu damarından L27 m, şüpheli Sulu damarından 1.80 m kalınlık teşekkür edebilmiştir.

— Nihayet, Sulu damarı lagünü kurumuş fakat diğer tarafta şüpheli Sulu damarı çökelmeye devam ederek 2.60 cm kalınlığa erişebilmiştir»

Not : Bibliyografa Fransızca makalenin sonundadır*

CORRÉLATION PALYNOLOGIQUE DES VEINES SULU ET SUPPOSÉE SULU DE GELÎK

Etol AKYOL

Mineral Research and Exploration Institute of Turkey

RÉSUMÉ. — Une partie de nos travaux de thèse concernait l'étude palynologique de cinq veines du Westphalien A qui sont les veines Acılık, Sulu, supposée Sulu, Hacı Memiş, et Milopero. Ici, nous voulons publier la composition et les caractères de la microflore des deux veines Sulu et supposée Sulu qui ne sont, d'ailleurs, qu'identiques à ceux des trois autres veines précitées. Nous voulons également mettre en évidence le tableau de corrélation sporo-pollinique de ces deux veines en cause.

A. ETUDE DES ECHANTILLONS

1. ECHANTILLONNAGE

Les échantillons proviennent de la région de Gelik de bassin de Zonguldak. 19 échantillons, divisant la veine Sulu en 19 niveaux, ont été recueillis de la galerie ⁺67, située entre les failles 4 et 8. D'autre part, 13 échantillons appartenant aux 13 niveaux de la veine supposée Sulu, proviennent de la galerie ^{*}30, située entre les failles 4, 7 et 8*. La distance entre ces deux galeries est approximativement 1 km et 1/2 (Tableaux I et II)*

Au point de recueillement des échantillons, un large affleurement du Westphalien constitue un axe dé synclinal E-W qui est bordé au S par des terrains namuriens. Des terrains plus jeunes, datant du Crétacé viennent reposer en discordance sur le Namurien au S ou sur la formation de Karadon (Westphalien B,C,D)»

La série de ce Westphalien A se raccorde avec la série-type de Kozlu où a été étudié, pour la première fois, le Westphalien A du bassin de Zonguldak*. Pour cette raison, le Westphalien A de ce bassin est appelé «la série de Kozlu» et la série-type, de la

Tableau - I



DÉTAIL DES NIVEAUX
ETUDIÉS

Tableau - II
POSITION GÉOLOGIQUE DES PRÉLÈVEMENTS



base jusqu'à la fin du Westphalien A moyen, comprend les veines suivantes :

veine Küçük	
veine Acılık	du Westphalien A inférieur
veine Sulu	
veine Hacı Memiş	
veine Neome	
veine Milopero	
veine Lükiça	
veine Messoğlu	
veine Acenta	
veiné Taşbacá	du Westphalien A moyen

Les deux veines étudiées se situent donc à la base du Westphalien A moyen*

2. RÉSULTATS QUALITATIFS ET QUANTITATIFS

Pour l'étude palynologique qualitative et quantitative de ces veines, il a été procédé au montage, entre lame et lamelle dans la glycérine gélatinée, d'une goutte du résultat de la macération du charbon de chaque niveau et compté 1 000 sporomorphes*. Pour quelques niveaux, il a été inutile de compter plus de 500 spores et pollens, car *Lycosisporites* (Schöpf, Wilson & Bentall) Levet-Carette, *Densisporites* (Berry) Levet-Carette et *Cyclogranisporites* Pot* & Krerap, qui sont les spores dominantes de ces niveaux, diminuent l'intérêt pratique des autres genres qui sont accessoires et rares, et suffisent à établir des corrélations palynologiques.

Les résultats quantitatifs sont reportés en pourcentage sur le Tableau III*. Ce tableau représente en abscisse des numéros correspondant chacun à un genre entrant au comptage de 1 000 sporomorphes et en ordonnée les veines Sulu et supposée Sulu avec leurs niveaux*

Les numéros en abscisse correspondent à :

- ! • *Laevigatosporites* Ibrahim
- 2» *Punctatosporites* Ibrahim
- 3. *Deltoidisporites* (Miner) Danzé-Corsin & Laveine
- 4* *Punctatisporites* (îbn) Pot, & Kr*
- 5» *Calamisporites* (Seh*, WiL & Bent*) Danzé-Cor, & Lav*




6. *Granulatisporites* Ibrahim
7. *Cyclogranisporites* Pot. & Kr.
8. *Verrucosisporites* Ibrahim
9. *Convolutisporites* (Hoff., Stap. & Mall.)
- 10*. *Planisporites* (Knox) Pot. & Kr.
11. *Apiculatisporites* (tbr.) Pot. & Kr.
12. *Anapiculatisporites* Pot. & Kr.
13. *Pustulatisporites* Pot. & Kr.
14. *Acanthisporites* (Naumova) Danzé, Levet-Carette & Loboziak
15. *Microreticulatisporites* (Knox) Pot. & Kr.
16. *Reticulatisporites* (İbr.) Pot. & Kr.
17. *Knoxisporites* Pot. & Kr.
18. *Lycosporites* (Sch., Wil. & Bent.) Levet-Carette
19. *Densisporites* (Berry) Levet-Carette
20. *Simozonisporites* (Naumova) Laveine
21. *Sinusisporites* (Artiiz)
22. *Callisporites* Butt. & Will.
23. *Cirratrisporites* (Wilson & Coe) Laveine
24. *Reinschisporites* (Sch., Wil & Bent.) Laveine
25. *Triquisporites* (Wilson & Coe) Danzé-Corsin & Laveine
26. *Ahrensisporites* Pot. & Kr.
27. *Micropollenites* (Dijkstra) Laveine

Sur cette liste, *Densisporites* (Berry) Levet-Carette groupe les spores des *Densisporites* (Berry) Levet-Carette, *Anulatisporites* Loose, *Cristatisporites* Pot. & Kr. et *Cingulizonatisporites* (Dyb. & Jach.). En effet, ces trois derniers genres peuvent facilement être confondus avec le premier et ne sont représentés que par un faible pourcentage qui peut être, par conséquent, additionné à celui des *Densisporites* (Berry) Levet-Carette.

3. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Les deux veines étudiées concernent le Westphalien A moyen. Les analogies palynologiques existant non seulement entre les veines Sulu et supposée Sulu, mais encore entre les veines Acılık, Hacı Memiş et Milopero nous poussent à tirer des conclusions de leurs diagrammes palynologiques n'intéressant que le Westphalien A inférieur et moyen. Cependant, d'après les résultats obtenus par

Tableau - III
COMPOSITION PALYNOLOGIQUE DES VEINES SULU ET SUPPOSÉE SULU



Y, Konyalı (1963), il apparaît qu'elles peuvent être étendues à la totalité du Westphalien A*. En effet, ses résultats, à partir d'une veine du Westphalien A supérieur* montrent les mêmes caractéristiques palynologiques que celles observées par moi-même»

Les caractéristiques les plus frappantes des diagrammes obtenus peuvent ainsi être résumées :

- a. Toutes les veines se ressemblent et sont quasi-identiques au point de vue de leur composition palynologique.

En effet, les genres :

- *Lycosisporites* (Sdhu, WiL & Bent*) Levet-Carette (représenté par *L. punctatus* Kosanke, en particulier et *L. pusillus* (îbr*) Sdhu, WiL & Bent*, *L. pseudoannulatus* Kosanke., *L. lepidus* Artiiz)
- *Densisporites* (Berry) Levet-Carette (représenté par *D. duriti* Pot* & Kr*, *D. lobatus* Kosanke, *D. capistratus* Hoff*, Stap* & Mal*, *D. loti* Bhard*, *D. sphaerotriangularis* Kosanke, *D. microsilvanus* Artiiz) et
- *Cyclogranisporites* Pot* & Kr* (représenté surtout par *C. leopoldi* (Kr.) Pot* & Kr* et par des espèces rares comme *C. aureus* (Loose) Pot* & Kr*, *C. elatus* Artiiz) forment les grands traits des diagrammes palynologiques* Chaque niveau est caractérisé par un ou souvent deux de ces genres et parfois par les trois*

Mais c'est le *Lycosisporites* (Sch*, Wil* & Bent*) Levet-Carette qui est le genre dominant, étant représenté par un pourcentage variant de 30 à 95%*. La plupart des niveaux contiennent des *Lycosisporites* (Sch*, Wil* & Bent*) Levet-Carette en pourcentage élevé et, quand celui-ci descend en-dessous de 50 %, c'est le genre *Densisporites* (Berry) Levet-Carette qui devient important* Le *Demisporites* (Berry) Levet-Carette est un des genres le plus irrégulier du Westphalien A* Il peut être inexistant (moins de 1 %) ou s'élever jusqu'à 70 %, tandis qu'on trouve le *Cyclogranisporites* Pot* & Kr* à chaque niveau, de façon presque régulier de 1 à 15 %.

Ainsi, pensons-nous que ces trois genres sont les genres principaux du Westphalien A et représentent les 75 à 95 % des spromorphes qui caractérisent palynologiquement un niveau* Les 5 à 25 % des spromorphes restants sont les spores et pollens accessoires dont les plus importants sont :

Calamisporites (Sch. WiL. & Bent.) Danzé-Cor. & Lav. (*C. mutabilis* (Loose) Sch., WiL & Bent.,, *C. hartungiana* Schöpf)

Planisporites (Knox) Pot. & Kr» (seule espèce rencontrée % P. *kosankei* Pot* & Kr.)

Granulatisporites Ibrahim (G. *par vus* (İbr*) Pot* & Kr*, *G. minutus* Pot. & Kr.)

Apiculatisporites (İbr.) Pot* & Kr. (*A. aculeatus* İbrahim, *A. abaküs* (Loose) Pot. & Kr*, *A. spinosus* Loose). . .

Reticulatisporites (İbr.) Pot & Kr. (i?. *clatriformis* Artiiz)

Deltoidisporites (Miner) Danzé-Cor. & Lav. (f• *convexus* Kosanke, *D. adnatoides* Pot. & Kr., ZX *adnatus* (Kos.) Pot. & Kr.)

Ces genres sont présents dans les niveaux de façon quasi-constante et en faible pourcentage.

Les genres comme;

Punctatisporites (İbr.) Pot. & Kr. (*P. obesus* (Loose) Pot. & Kr., *P. punctatus* İbrahim., *P. minutus* Kosanke); *Convolutiporites* Hoff., 5 tap. & Mail.; *Microreticulatisporites* (Knox) Pot. & Kr.j *Dictyisporites* (Naumova) Le vet-Car ette (*D. bireticulatus* (Ibr.) Pot. & Kr.); *Sinusisporites* (Artiiz) (*S. sinuatus* Artiiz); *Callisporites* Butt. & WiL (*C. nux* Butt. & WiL); *Cirratrisporites* (Wilson & Coe) Laveine (*C. saturni* (İbr.) Sch., WiL & Bent.); *Reinschisporites* (Sch., WiL & Bent.) Laveine (*R. spesiosus* (Loose) Sch., WiL & Bent., i?, *fimbriatus* Artüz); *Ahrensisporites* Pot. & Kr. {*A. guerickei* (Horst) Pot. 6 Kr.^ *A. angulatus* Kosanke, *A. marmaris* Akyol}; *Florinipollenites* (Sch., WiL & Bent.) Laveine (*F. volans* (Loose) Pot. & Kr.); *Micropollenites* (Dijkstra) Laveine (*M. radiatus* İbrahim)

sont irrégulièrement présents et sous de faibles pourcentages.

On rencontre rarement et à quelques niveaux seulement, les genres suivants •:

Laevigatosporites İbrahim^ *Punctatosporites* İbrahim., *Verrucosisporites* İbrahim, *Anapiculatisporites* Pot. & Kr.^ *Acanthisporites* (Naumova) Danzé, Levet-Carette & Loboziak, *Knoxisporites* Pot. & Kr., *Simozo*nisporites* (Naumova) Laveine, *Triquisporites* (Wilson & Coe) Danzé-Cor. & Lav.

b. Les- spores raenolètes sont très peu nombreuses«

Nous n'avons observé qu'un seul *Punctatosporites* İbrahim (veine Sulu, niveau 2) et très peu de *Laevigatosporites* İbrahim dans la

veine Sulu* II n'a été rencontré aucun *Torosporites* (Balme) Laveine qui est le genre caractéristique du Westphalien C et D*

c. Les pollens sont maî représentés dans le.' Westphalien A inférieur et moyen«

Parmi les genres rencontrés (*Florinipollenites* (Sch*, WiL & Bent*) Laveine, *Micropollenites* (Dijkstra) Laveine, *Fragilipollenites* Konyalı, *Alipollenites* (Daug-) Danzé-Cor, & Laveine, *Alatipollenites* (ibr-) Lav. et *Endopollenites* (Wilson & Coe) Laveine), seul le genre *Florinipollenites* (Sch-, WiL & Bent*) Laveine figure à chaque veine, de façon plus ou moins régulière*

d. Le *Lycosisporites* (Sch«, WiL & Bent«) Levet-Carette étant le genre dominant et le *Cyclogranisporites* Pot. & Kr« de pourcentage quasi **constant**, les variations de *Densisporites* (Berry) Levet-Carète constituent l'**élément** essentiel pour rechercher des corrélations«

B* CORRÉLATION DES VEINES SULU ET SUPPOSÉE SULU

Les deux principales méthodes de corrélation palynologique bien connues sont:

- 1, Méthode de sectionnement du profil intégral et
- 2, Méthode de l'échantillon moyen*

La deuxième méthode a ses avantages de rapidité sur la première et ainsi est plus utilisée. L'exemple de corrélation des veines Sulu et supposée Sulu, qui se montre bien particulier, démontre que la première méthode pourrait être plus avantageuse, du point de vue d'apport d'exactitude aux travaux géologiques et d'exploitation»

La méthode de l'échantillon moyen peut donner de bons résultats dans le Westphalien A du bassin de Zonguldak, car le pourcentage de *Densisporites* (Berry) Levet-Carette varie de façon très sensible de veine à veine* Mais il est des cas où une veine ne correspond qu'à une partie d'une autre, comme c'est le cas des veines Sulu et supposée Sulu, il est alors nécessaire de sectionner les veines et mettre au point leur composition palynologique niveau par niveau*

Pour les genres principaux* nous avons additionné les pourcentages de chaque niveau et divisé le résultat par le nombre de

niveaux. Nous avons ainsi obtenu, pour ces genres, la composition de l'échantillon moyen avec une marge d'erreur de 5 %. Alors, on obtient pour ces deux veines, les résultats suivants :

	<i>Lycosisporites</i>	<i>Densisporites</i>	<i>Cy dogr ani spor ite s</i>	
Veine Sulu	80	6		4
Veine supposée Sulu..	59	28		4

Tableau - IV

COMPARAISON DES NIVEAUX DES VEINES SULU ET SUPPOSÉE SULU							
Niveaux	Veine Sulu			Veine supposée Sulu			Niveaux
	<i>Lycosp.</i> (%)	<i>Densi-</i> <i>spp.</i> (%)	<i>Cyclogra-</i> <i>nisp.</i> (%)	<i>Lycosp.</i> (%)	<i>Densi-</i> <i>spp.</i> (%)	<i>Cyclogra-</i> <i>nisp.</i> (%)	
				22	66	2,2	13
				18	75	14	12
19	<i>Ne contiennent pas de sporomorphes</i>			37	50	2,2	11
18	<i>Ne contiennent pas de sporomorphes</i>			59	34	2	10
17	60	11	1,8	60	27	2	9
16							
15	86	1,3	3,1	89	1	2,2	8
14							
13	75	0,2	5,4	89	1	2,2	7
12							
11	70	0,1	21	71	10	7	6
10	79	2,3	6,6	74	4,3	7,4	5
9	15,4	66	1,1	24,6	58,3	1,6	4
8	80	4,6	3,7	77	12	2,8	3
7	91	0,5	1	82	1,4	2	2
6	92	2,5	0,4				1
5	95	0,4	0,5				
4	94,5	0,6	1				
3	83	0,5	4,6				
2	88	0,5	5,7				
1	94	0,1	0,9				

D'après ces résultats, les veines Sulu et supposée Sulu se montrent très différentes» La comparaison niveau par niveau de ces deux veines est reportée sur le Tableau IV*

Comme Fon voit sur ce tableau, les niveaux palynologiquement identiques sont *t*

Ceci démontre que t

- La lagune où la veine Sulu s'est déposée, fonctionnait avant la lagune où s'est formée la veine supposée Sulu* Ainsi, 41 cm de la veine Sulu ont pu être sédimentés avant que ne débutent les apports correspondant à la veine supposée Sulu;
 - Ensuite, une lagune s'est installé au point où s'est formée la veine supposée Sulu. Dans les deux lagunes, se déposent en même temps 1,27m de la veine Sulu et 1,80-m de la veine supposée Sulu;
 - Et enfin, la lagune de la veine Sulu cesse de fonctionner, tandis que dans l'autre, la veine supposée Sulu continue de se déposer pour atteindre sa puissance de 2,60 m.

BIBLIOGRAPHIE

ALPERN* B, (1959) : Contribution à l'étude palynologique et pétrographique des charbons français. *Thèse d'Etat*, Paris.

-ARTÜZ, S. (1959) : Zonguldak bölgesindeki Alimolla, Sulu ve Büyük damar-
larının sporolojik etüdü. *İst. Üniv* Fen. Fak. Monografileri** İstanbul.

BUTTERWORTH & WILLIAMS (1956- 1958) : The small spore floras of coals in the limestone coal group and upper Limestone group of the Lower Carboniferous of Scotland. *Trans* Royal Soc* Edinburgh*[^] -vol,- LXIII* part II

- CORSIN, P.; CARETTE, J.j DANZÉ, J. & LA VEINE, J. P. (1962) : Classification des spores et des pollens du Carbonifère au Lias. *C. R. Acad. Se»,* t. 254, pp* 3062-3065, Lille.
- CORSIN, P. M., LAVEINE, J. P., LEVET~CARETTE, J. & LOBOZIAK, S. (1965) : Sur la classification des spores et des pollens du Carbonifère au Lias de P. Corsin, J. Carette, J. Danzé et J. P. Laveine. Mise au point et application. *Annales de la Soc. Géol. du Nord,* t. LXXXV, pp. 327-336.
- «
 COUPER., R. A. (1958) : British Mesozoic microspores and pollen grains. A systematic and stratigraphic study. *Palaeontographica, Abt. B, B. 103»* pp. 75 - 179, Stuttgart.
- DYBQVA, S, & JACHQWICZ, A. (1957) : Mierospores of the Upper Silesian coal measures. *Instit. Geol. Praco Polska, v. XXIII.* Warszawa.
- İBRAHİM, A» (1933) : Sporenformen des Agirhorizontes des Ruhrreviers. *Dissert. TA., Berlin.*
- KONYALI, Y. (1963) : Contribution à l'étude des microspores du bassin houiller d'Amasra (Secteur sud). *Th. 3e Cycle, Fac. Se. Lille:*
- KOSANKE, R. M. (1950) : Pennsylvanian spores of Illinois and their use in correlation. *Illinois GeoL Sur. Bull.,* no. 74, pp. 1 - 128, Urbana.
- LOOSE, F. (1934) : Sporenformen aus dem Flöz Bismarck des Ruhrgebietes. *Arb« Institut. Paläobot* Brennsteine, V. 4,* pp. 127-164, Berlin.
- POTONIÉ, R. (1956) : Synopsis der Gattungen der Sporae dispersae. I. Beih. *GeoL Jh*j* no. 23, Hannover.
- (1958) : Synopsis der Gattungen der Sporae dispersae. II. Beih. *Geol. Jb.3* no* 31, Hannover,
- (1960) : Synopsis der Gattungen der Sporae dispersae. III. Beih. *GeoL Jb.* no. 39, Hannover.
- ; İBRAHİM, A. & LOOSE, F. (1932) : Sporenformen aus den Flözen Agir und Bismarck des Ruhrgebietes. *Neu. Jb. Miner., B.* 67, pp. 438 - 454.
- — & KREMP,-G. (1955) : Die Sporae dispersae des Ruhrkarbons I. *Palaeontographica, Abt» B, B.* 98, pp. 1 - 136, Stuttgart.
- — & ——(1956) Die Sporae dispersae des Ruhrkarbons IL *Palaeontographica, Abt* B, B.* 99, pp. 85 - 191, Stuttgart.
- .— — & —— (1956) : Die Sporae dispersae des Ruhrkarbons III. *Palaeontographica, Abt. B, B.* 100, pp» 65 - 121, Stuttgart. ^
- STAPLIN, F. L. (1960) : Upper Mississippian plant spores from the Golata formation Alberta Canada. *Palaeontographica, Abt. B, B.* 107, pp. 1-40, Stuttgart.